



Lämpöhalvaus

Lämpimällä säällä lämpöhalvaus uhkaa lemmikkejämme. Lyhytkuonoiset ja sydänvikaiset lemmikit ovat erityisesti riskiryhmää. Aurinkoisella ilmalla auton sisälämpötila nousee nopeasti vaarallisen kuumaksi. Pelkkä ikkunoiden raotus ei riitä takaamaan riittävää ilmanvaihtoa ja viilennystä. Koiraa ei koskaan saa jättää aurinkoisella ilmalla autoon. Myös rankka liikunta lämpimällä säällä voi aiheuttaa lämpöhalvauksen. Helteillä ulkoiluttaminen on hyvä hoitaa aamun ja illan viileämmällä ilmalla. Raikasta vettä on aina oltava saatavilla.

Lämpöhalvaus on hengenvaarallinen tila. Oireita ovat mm. läähättäminen, oksentelu, ripuli, vapina ja kouristukset. Peräsuolesta mitattu lämpötila on yli 41 °C. Lämpöhalvauksen ensiavuksi lemmikki viedään viileään paikkaan ja sen päälle valellaan viileää (ei jääkylmää) vettä. Eläin voidaan myös kietoa kylmään veteen kastettuihin pyyhkeisiin. Viilennystä jatketaan vähintään 15 - 30 minuuttia. Viilennyksen aikana eläimen lämpötilaa tulee mitata säännöllisesti peräsuolesta, jotta lämpötila ei laske liikaa. Koiran ja kissan normaalilämpötila on 38 - 39 °C peräsuolesta mitattuna. Mikäli lemmikin vointi ei viilennyksen aikana palaudu normaaliksi, on se vietävä viipymättä eläinlääkärille.

Kyynpurema

Kyynpureman jälkeen eläin tulisi aina viedä eläinlääkärille mahdollisimman pian. Ennen eläinlääkärille pääsyä lemmikki pidetään täydellisessä levossa, jotta myrkyä leviämisen hidastuisi. Nykyisin käydään keskustelua kyytablettien tarpeellisuudesta. Kyytabletti saattaa peittää lemmikin oireita ja hoitoon pääsy saattaa tästä syystä viivästyä. Kivun helpottaessa lemmikki myös liikkuu enemmän ja myrky leviää nopeammin elimistössä. Eläinlääkärin vastaanotolla lemmikin todellista hoidontarvetta on vaikeampi arvioida, jos se on saanut kyytabletteja. Mikäli matka eläinlääkärille on pitkä tai turvotus uhkaa tukkia hengitystiet, voidaan kyytabletteja antaa yksi tabletti kymmentä painokiloa kohden. Kyytablettista huolimatta lemmikki on kuitenkin aina toimitettava eläinlääkärille jatkohoitoon.

Hyönteisenpistot

Ampiaisten ja muiden hyönteisten kutiseviin ja turvottaviin pistoksiin voi käyttää ensiapuna kyytabletteja. Kissalle annetaan puolikas tabletti kerta-annoksena. Koiralle annetaan yksi tabletti kymmentä painokiloa kohden.

Ikkunat

Joka kevät ja kesä aivan liian moni kissa putoaa ikkunasta tai parvekkeelta. Jo ensimmäisestäkin kerroksesta putoaminen voi aiheuttaa kissalle vakavia vammoja. Tuuletusikkunoissa tulisikin aina olla kissan kestävä verkko ja parvekkeilla lasitus tai verkko kissan suojaksi. Myös pienet kolot on muistettava tukkia, koska kissa mahtuu yllättävän pienistä rakosista.



HERTTONIEMEN
ELÄINLÄÄKÄRIASEMA
www.lemmikkilaakari.fi

Punkit

Punkki eli puutiainen (*Ixodes ricinus*) voi levittää useita tauteja niin ihmisille kuin eläimillekin. Borrelioosi ja anaplasmoosi voivat aiheuttaa koirille mm. nivel- ja lihasoireita, kuumetta ja hermosto-oireita. Puutiaisaiivokuume on yleensä oireeton. Kissat voivat olla taudinkantajia, mutta eivät yleensä itse sairastu punkkien levittämiin sairauksiin.

Punkeilta on helppo suojautua apteekeissa ja eläinlääkäriasemilla myytävillä paikallisvaleyliuoksilla. Niskaan laitettavat liukset antavat noin kuukauden suojan punkkeja vastaan. Koirille on olemassa myös pitempään vaikuttavia punkkipantoja. Panta on aina muistettava poistaa uimisen ja pesun ajaksi. Jotkut koirien punkkilääkkeistä ovat myrkyllisiä kissoille, joten kissoille on aina käytettävä niiden omia punkkikarkotteita.

Yksikään punkkilääke ei anna täydellistä suojaa punkkeja vastaan, joten lemmikki on punkkilääkityksestä huolimatta syytä tarkastaa säännöllisesti punkkien varalta. Punkki poistetaan lemmikin iholta punkkipihdeillä. Pihtejä varovasti pyörittämällä ja vetämällä hitaasti punkki saadaan irti kokonaisuena. Punkkia ei saa puristaa, jotta sen vatsan sisältö ei tyhjenisi puremakohtaan. Punkin rasvaaminen on vanhan kansan konsti, jota ei nykyisin suositella.

Artikkelin kirjoittaja: Herttoniemen eläinlääkäriasema

© 2010 Herttoniemen eläinlääkäriasema. Tämän artikkelin kopioiminen osittain tai kokonaan on kielletty ilman Herttoniemen eläinlääkäriaseman lupaa.